



کاربرد از طریق ریشه در ۱۰۰۰ متر مربع

زمان تأثیرات	قبل از کاشت	انتقال نشاء	چهار برگی	قبل از گلدهی	شروع باردهی		
					ماه اول	ماه دوم	ماه سوم
تغذیه پایه (چالکود) افزایش کارایی NPK با اضافه کردن آمینوسوپر	میکرو گرانول فرو پلاس ۵۰۰ کیلو				آمینو سوپر + ۵ لیتر آمینو سوپر +		
	گرانول یونیورسال ۵۰۰ کیلو			اگری گرین ۲۰-۲۰-۲۰ ۱۰ کیلو	اگری گرین ۳۰ - ۰۵ - ۱۵ ۱۰ کیلو در هر ماه		
افزایش عملکرد توسط عناصر پرنیاز نیتروژن ، پتاسیم ، سولفور و منیزیم					سولفات آمونیم Crystal monio ۲۰ کیلو	سولفات آمونیم Crystal monio ۲۰ کیلو	سولفات آمونیم Crystal monio ۲۰ کیلو
					سولفات منیزیم Epsa top ۱۰ کیلو	سولفات منیزیم Epsa top ۱۰ کیلو	سولفات منیزیم Epsa top ۱۰ کیلو
					سولفات پتاسیم Solu sop ۱۰ کیلو	سولفات پتاسیم Solu sop ۱۰ کیلو	سولفات پتاسیم Solu sop ۱۰ کیلو
کاهش تنش		آمینو اسپرینت منیزیم ۵ لیتر					
افزایش ماده آلی خاک			هیومیک AU 15 ۵ لیتر				
پیشگیری و درمان کلروز آهن		سولفات آهن ۵ کیلو		کلات آهن فر تو ۶ ۳ کیلو			

توصیه ویژه محلول پاشی :

- ۱ - برای افزایش کیفیت و ماندگاری میوه در زمان باردهی از آمینو اسپرینت کلسیم با غلظت ۴ در هزار استفاده گردد.
 - ۲ - جهت بهبود گلدهی ، افزایش تشکیل میوه و رشد بهتر میوه ها، در مرحله قبل از گلدهی از ویگورامین بور با غلظت ۲ در هزار استفاده گردد.
- پیشنهاد میگردد برای کاهش شوری خاک ، آمینو اسپرینت کلسیم از طریق ریشه مصرف گردد.