



محلول پاشی

زمان	متورم شدن جوانه ها	قبل از گلدهی	اتمام گلدهی و شروع تورم حبه	سایز گرفتن حبه ها و رسیدن میوه
تأثیرات				
مقاومت به بیماریهای قارچی تحریک گیاه و رشد حبه ها		P - K 30 - 20 ۲ لیتر در هکتار		
محرک رشد حبه ها			* جلبک دریایی Agtron Alga ۲ لیتر در هکتار	
کاهش ریزش شکوفه ها افزایش تشکیل میوه افزایش مقاومت گیاه به استرس (سرمازدگی)	* آمینوسوپر + روی + بور ۵ لیتر در هکتار			
بهبود سفتی حبه ها مقاومت به بیماری پوسیدگی خوشه انگور				* کالمنگ ۳ لیتر در هکتار

کاربرد خاکی

زمان	اواخر زمستان چالکود	قبل از گلدهی	اتمام گلدهی	قبل از رسیدن میوه
تأثیرات				
تغذیه پایه با عناصر ماکرو و میکرو آنتی استرس و افزایش کارایی کود NPK با اضافه کردن آمینوسوپر	کود گرانول ماکرو و میکرو ۵۰ گرم برای هر بوته	* آمینوسوپر + ۵ لیتر آمینوسوپر در هر هکتار +		
پیشگیری و درمان کلروز آهن		سولفات امونیوم CRYSTAL MONIO ۵۰ کیلو در هکتار	۲۰ - ۲۰ - ۲۰ ۲۰ کیلو NPK در هکتار	* سولفات پتاسیم Solu SOP ۵۰ کیلو در هکتار
تغذیه جایگزین مجاز در کشاورزی ارگانیک		* هیومیک FERTITAL ۲۰ لیتر در هکتار	کلات آهن Fe plus ۱۰ تا ۲۰ گرم برای هر بوته	* آمینو اسپرینت کلسیم ۲۰ لیتر در هکتار

* محصولات ستاره دار، قابل مصرف در کشاورزی ارگانیک می باشند.
محلول پاشی جای کوددهی منظم از طریق ریشه را پر نخواهد کرد و این تکنیک فقط در مواقع ضروری، سرعت جذب مواد غذایی را در گیاه افزایش میدهد.

